



ASPIRINETAS®

Aspirina 100 mg

■ Comprimidos

■ Antiagregante plaquetario - Analgésico - Antiinflamatorio

■ Venta libre

Industria Argentina

■ COMPOSICIÓN

Ácido acetilsalicílico 100 mg, en un excipiente de almidón de maíz 8,2 mg, celulosa polvo 10,0 mg, aroma de vainilla tutti – frutti 0,8 mg, punzó 4R laca aluminica 0,2 mg y sacarina sódica 0,8 mg

■ ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Antiagregante plaquetario.

■ USO DEL MEDICAMENTO: lea detenidamente esta información.

Adultos: Previo diagnóstico médico, Aspirinetas está indicada para la prevención primaria de un primer infarto en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, etc.

Niños: Aspirinetas está indicada para el alivio sintomático de dolores ocasionales leves o moderados, dolores de cabeza, dentición y para bajar la fiebre.

■ COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Los comprimidos se pueden ingerir, masticar o disolver sobre la lengua. Tome los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

Para su uso en niños pequeños deshacerlos en un poco de líquido o papilla.

Adultos: Como antiagregante plaquetario un comprimido diario o la dosis sugerida por su médico.

Niños: Dosis: 50 mg/kg/día.

Edad (años)	Peso (kg)	Dosis
2 a 4 años	14 a 16	2 comp. 3 veces por día
4 a 6 años	17 a 20	3 comp. 3 veces por día
6 a 9 años	21 a 29	4 comp. 3 veces por día
9 a 12 años	30 a 38	5 comp. 3 veces por día

En niños menores de 2 años se deberá consultar al médico.

■ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este medicamento no debe administrarse a menores de 2 años sin consultar al médico.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días; si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consulte al médico inmediatamente.

No use este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consulte con el médico.

Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte con el médico.

No administre este medicamento a menores de 15 años en caso de síntomas de GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Si usted consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte con su médico.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

■ REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

■ INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte con su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

■ SOBREDOSIS

En caso de sobredosis concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Consultas o sugerencias: llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 25 °C.

■ PRESENTACIÓN

Envases con 28 comprimidos.

© Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania,

en calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A.,

Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD) Munro, Buenos Aires.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud,

certificado N° 21.244

Fecha de última revisión: 28/06/2007