


PROYECTO DE RÓTULO/ PROSPECTO



BAYASPIRINA®

ASPIRINA 500 mg

Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

¿QUE CONTIENE BAYASPIRINA®?

BAYASPIRINA® contiene, como ingrediente activo, 500 miligramos de Aspirina por comprimido e ingredientes no activos: almidón de maíz y celulosa en polvo.

ACCIONES

BAYASPIRINA® calma el dolor, baja la fiebre y reduce la inflamación.

¿PARA QUÉ SE USA BAYASPIRINA®?

BAYASPIRINA® se usa en los siguientes casos:

- *dolores ocasionales leves o moderados, como ser de cabeza, dentales, musculares o de espalda, articulares.
- * Ataques agudos de migraña diagnosticada (enfermedad que se manifiesta como dolor de cabeza de característica intenso, pulsátil que puede irradiarse a la sien, oreja, mandíbula o alrededor del ojo y puede acompañarse de náuseas, vómitos, lagrimeo y fotosensibilidad entre otros síntomas).
- * alivio de síntomas de resfrío y estados gripales
- * para reducir la fiebre

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR BAYASPIRINA®?

- * NO USE este producto si usted sabe que es alérgico a la aspirina o a algún otro de sus ingredientes, en niños menores de 16 años sin consultar al médico, o si ha tenido episodios previos de asma provocados por aspirina u otros fármacos de acción similar, como por ejemplo otros analgésicos.
- * NO USE este producto si está tomando anticoagulantes, medicamentos para reducir azúcar en sangre, diurético, corticoide.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR BAYASPIRINA®?

En niños y adolescentes, en caso de síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA, consulte a su médico ya que podría incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ.

PLB_BAYASPIRINA_CCDS 5.0



BAYER S.A.
(18009840) Munro

BAYER S.A.

VERÓNICA GARA
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
MATRICULA PROFESIONAL N.º 2222

m

0255



Si usted tiene problemas de asma, diabetes, presión alta, problemas de insuficiencia cardíaca, renal o hepática, gota, hemofilia o problemas de coagulación o toma 3 o más de vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de tomar BAYASPIRINA®.

Si usted presenta deficiencia severa de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, la aspirina puede inducir hemólisis o anemia hemolítica, consulte a su médico.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar BAYASPIRINA®.

Si va a ser sometido a alguna operación, consulte a su médico antes de tomar Bayaspirina.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO BAYASPIRINA®?

Pueden aparecer efectos no deseados, como reacciones alérgicas, urticaria y picazón, náuseas, vómitos, irritación gástrica y/o aumento del riesgo de sangrado.

Suspenda el uso de BAYASPIRINA® y consulte al médico si aparecen molestias gástricas, erupciones en la piel, dificultad respiratoria o vértigo.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días o la fiebre persiste más de 3 días; empeoran o aparecen nuevos síntomas.

¿COMO USAR BAYASPIRINA®?

Adultos y mayores de 16 años:

* 1 comprimido cada 6-8 horas.

Dosis máxima: 6 comprimidos por día.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia con algún alimento.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame sin cargo a Bayer al 0800-888-8020 de lunes a viernes de 9 a 16 horas o al teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234

Mantener fuera del alcance de los niños.



Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C

SILVIA TORRIZIO
ALICIA RODRIGUEZ

BAYER S.A.
VERÓNICA...
FARMACIA...
CO-DIRECTORA...
MATRICULA PROFESIONAL...

M



® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en Calle 8 entre 5, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.521

Fecha de última revisión:

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos



Versión: CCDS_05

[Handwritten signature]
BAYER S.A.
R. Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro
SILVIA FARRIZIO
APODERADA

[Handwritten signature]
BAYER S.A.
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro
VERÓNICA OSBARO
FARMACÉUTICA
CC-DIRECCIÓN NACIONAL
MATRÍCULA PROFESIONAL N° 12.110

M

PROYECTO DE PROSPECTO DISPENSER (BLISTER)



BAYASPIRINA®
ASPIRINA 500 mg
Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

¿QUE CONTIENE BAYASPIRINA®?

500 mg de Aspirina x comp., almidón de maíz y celulosa en polvo.

ACCIONES

calma el dolor, baja la fiebre y reduce la inflamación.

¿PARA QUÉ SE USA BAYASPIRINA®?

- *dolores ocasionales leves o moderados, como ser de cabeza, dentales, musculares o de espalda, articulares.
- * Migraña (enfermedad que se manifiesta como dolor de cabeza de característica intenso, pulsátil que puede irradiarse a la sien, oreja, mandíbula o alrededor del ojo y puede acompañarse de náuseas, vómitos, lagrimeo y fotosensibilidad entre otros síntomas).
- * alivio de síntomas de resfrío y estados gripales
- * para reducir la fiebre

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR BAYASPIRINA®?

- * los alérgicos a la aspirina o a otro de sus ingredientes, niños menores de 16 años sin consultar al médico, o si ha tenido episodios previos de asma provocados por aspirina u otros fármacos de acción similar, x ej: otros analgésicos.
- * las que están tomando anticoagulantes, medicamentos para reducir azúcar en sangre, diurético, corticoide.

¿COMO USAR BAYASPIRINA®?

- * 1 comprimido cada 6-8 horas.

Dosis máxima: 6 comprimidos por día.

Tomar con suficiente cantidad de agua, de preferencia con algún alimento.


¿QUE DEBO HACER SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555.

BAYER S.A.
Ricardo Gutiérrez 3700 - (1616) Monte
VERÓNICA CASANO
FARMACIA
CO DIRECTORA
TRUJILLA PRODUCCIONES

M



Consultas: llame sin cargo a Bayer al 0800-888-8020 de lu a vi de 9 a 16 hs o a la ANMAT
Responde: 0800-333-1234

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C


® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fab. s/fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, Calle 8 e/3 y 5, P.Ind.Pilar por
BAYER S.A., R. Gutiérrez 3652, Munro, Prov. BsAs, Arg.


DT: Farm. JL Role

Autorizado por el Min. Salud, cert. 9.521



BAYER S.A.
R. Gutiérrez 3652 - (B1603ENR) Munro
SILVIA FABRIZIO
APODERADA


BAYER S.A.
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1603ENR) Munro
VERÓNICA CARRIZO
FARMACÉUTICA
C.C. 40000000000000000000
MATRICULA PROFESIONAL

M



0255



PROYECTO DE RÓTULO/ DISPENSER

BAYASPIRINA®
ASPIRINA 500 mg
Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

¿QUE CONTIENE BAYASPIRINA®?

BAYASPIRINA® contiene, como ingrediente activo, 500 miligramos de Aspirina por comprimido e ingredientes no activos: almidón de maíz y celulosa en polvo.

ACCIONES

BAYASPIRINA® calma el dolor, baja la fiebre y reduce la inflamación.

¿PARA QUÉ SE USA BAYASPIRINA®?

BAYASPIRINA® se usa en los siguientes casos:

- *dolores ocasionales leves o moderados, como ser de cabeza, dentales, musculares o de espalda, articulares.
- * Ataques agudos de migraña diagnosticada (enfermedad que se manifiesta como dolor de cabeza de característica intenso, pulsátil que puede irradiarse a la sien, oreja, mandíbula o alrededor del ojo y puede acompañarse de náuseas, vómitos, lagrimeo y fotosensibilidad entre otros síntomas).
- * alivio de síntomas de resfrío y estados gripales
- * para reducir la fiebre

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR BAYASPIRINA®?

- * NO USE este producto si usted sabe que es alérgico a la aspirina o a algún otro de sus ingredientes, en niños menores de 16 años sin consultar al médico, o si ha tenido episodios previos de asma provocados por aspirina u otros fármacos de acción similar, como por ejemplo otros analgésicos.
- * NO USE este producto si está tomando anticoagulantes, medicamentos para reducir azúcar en sangre, diurético, corticoide.


¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR BAYASPIRINA®?

En niños y adolescentes, en caso de síntomas de infecciones virales como GRIPE o VARICELA, consulte a su médico ya que podría incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ.

[Handwritten signature]
 BAYER S.A.
 R. GILBERTO (STANBRO) Mendo
 LABORATORIO GENERALA
 PLB_BAYASPIRINA_CCDS 5.0

[Handwritten signature]
 BAYER S.A.
 C. GILBERTO (STANBRO) Mendo
 LABORATORIO GENERALA
 FARMACÉUTICA
 LABORATORIO TÉCNICA
 LABORATORIO GENERALA Nº 11111

M



Si usted tiene problemas de asma, diabetes, presión alta, problemas de insuficiencia cardíaca, renal o hepática, gota, hemofilia o problemas de coagulación o toma 3 o más de vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de tomar BAYASPIRINA®.

Si usted presenta deficiencia severa de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, la aspirina puede inducir hemólisis o anemia hemolítica, consulte a su médico.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar BAYASPIRINA®.

Si va a ser sometido a alguna operación, consulte a su médico antes de tomar Bayaspirina.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO BAYASPIRINA®?

Pueden aparecer efectos no deseados, como reacciones alérgicas, urticaria y picazón, náuseas, vómitos, irritación gástrica y/o aumento del riesgo de sangrado.

Suspenda el uso de BAYASPIRINA® y consulte al médico si aparecen molestias gástricas, erupciones en la piel, dificultad respiratoria o vértigo.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días o la fiebre persiste más de 3 días; empeoran o aparecen nuevos síntomas.

¿COMO USAR BAYASPIRINA®?

Adultos y mayores de 16 años:

* 1 comprimido cada 6-8 horas.

Dosis máxima: 6 comprimidos por día.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia con algún alimento.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?


Llame sin cargo a Bayer al 0800-888-8020 de lunes a viernes de 9 a 16 horas o al teléfono de ANMAT Responde: 0800-333-1234

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C

M



® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.521

Fecha de última revisión:

Caja con 3, 4, 5, 10 ó 12 blisters de 10 comprimidos cada uno.

Versión: CCDS_05

[Handwritten signature]
BAYER S.A.
R. Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro
SILVIA FARRIZIO
APODERADA

[Handwritten signature]
BAYER S.A.
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro
VERÓNICA SABARO
COM. DE FARMACIA
MATRICULA N° 123456789

[Handwritten mark]